

Öppettider Jul & Nyår 2016

Nordic IVF Center Malmö stänger för juledighet den 23 december och öppnar åter den 9 januari, kl. 08:00.

Måndagen den 2/1 har vi telefonmottagning kl 09-12 för er som vill planera behandling, boka nybesök eller har frågor.

För er som har genomgått behandling hos oss i december, och för er som planerar behandling i januari vill vi upplysa om följande:

Planerad IVF behandling (ägguttag) i januari 2017

Om du/ni vill starta en behandling under tiden som kliniken har stängt måste ni kontakta oss innan den 22/12. Ni kommer då att få recept förskrivet samt information om datum för planerad start med hormoninjektioner. För er som är planerade för behandling med kort protokoll kan start med hormoninjektioner ske tidigast den 2/1 2017. Om långt protokoll planeras och du har startat med Synarela nässpray i december kan du ringa oss den 2/1 för att få besked om datum för start med hormoninjektioner.

Planerad behandling med återföring av frysta/tinade embryon i januari 2017

Om du planerar återföring i naturlig cykel och får mens i början av januari. Ring oss den 2/1 eller maila till oss för att få tid för ultraljud.

Om du planerar återföring i cykel med hormonbehandling (T. Progynon) och har avtalat din start med kliniken kan du starta din behandling med Progynon om menstruationen kommer 29/12 eller senare. Ring oss den 2/1 eller maila oss för att boka tid för ultraljudskontroll.

Om du planerar återföring i cykel med T. Letrozole och har avtalat din start med kliniken och fått recept kan du starta din behandling om menstruationen kommer 30/12 eller senare. Ring oss den 2/1 eller maila oss för att boka tid för ultraljudskontroll.

Rapportera resultat av graviditetstest

För att lämna resultat på graviditetstest ring eller maila oss måndagen 9/1.

Blödning eller smärtor i tidig graviditet

Om du får smärtor eller blödning i tidig graviditet, vänligen kontakta Kvinnokliniken på hemorten.

Överstimuleringssyndrom

Om du skulle få symptom på överstimulering ber vi dig vända dig till Kvinnokliniken vid hemortslasarettet. Överstimulering innebär att äggstockarna förstoras och vätska kan ansamlas i buken. Symptom är viktuppgång, buksmärta, svullnad buk och eventuellt andnöd. Vid överstimulering kommer besvären oftast inom två veckor efter embryoåterföringen. En överstimulering påverkar inte en graviditet negativt men är en komplikation för kvinnan